



แนวทางการเลือกใช้ยาลดระดับไขมันในเลือดของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์



ขั้นตอนที่ 2 (ต่อ)




ชื่อยา	ระยะที่ 1-2 (GFR≥60)	ระยะ 3a (GFR 45-59)	ระยะ 3b-5 (GFR < 45)	ผู้ป่วยปลูกถ่ายไต
Atorvastatin 40: E, 80: PP	40 – 80 mg/day		20 – 40 mg/day	20 mg/day
Rosuvastatin 10,20: PP	20 mg/day		10 mg/day	5 mg/day
Simvastatin 10,20,40: E	40 mg/day		20 – 40 mg/day	20 mg/day
Pitavastain 2:P, PP	4 mg/day		2 mg/day	ไม่มีข้อมูล
Simvastatin/Ezetimibe 20/40:P	40/10 mg/day		20/10 mg/day	
Cholestyramine 4: E	16 mg/day			
Fenofibrate	200 mg/day	100 mg/day*	GFR < 30	ไม่ควรใช้
Gemfibrozil	1,200 mg/day		600 mg/day	
Ezetimibe	10 mg/day			
Niacin	2,000 mg/day		1,000 mg/day	ไม่มีข้อมูล

High - Intensity		Moderate - Intensity		Low - Intensity	
Atorvastatin	40 mg : E ง	Rosuvastatin	10 mg : P	Simvastatin	10 mg : E ก
	80 mg : PP	Simvastatin	20 mg : E ก		
Rosuvastatin	20 mg : P		40 mg : E ก		
		Pitavastatin	2 mg : P,PP		

สัญลักษณ์



* รูปแบบ capsule non-micronized



สัญลักษณ์

→ Switch

⇒ Switch / Add on